

VUmc_CAT_PFC_B15_2017-07-14_inzage

Wednesday, July 05, 2017 14:00

Block 1, 51 question(s), maximum score 51
CAT PFC B15 14-7-2017 INZAGE**1 of 51**Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Mevrouw D., 85 jaar, wordt opgenomen op de afdeling interne geneeskunde vanwege een urineweginfectie. Zij is bekend met de ziekte van Parkinson en dementie.
Op de afdeling is zij verward, gedesoriënteerd in tijd en plaats, en onrustig. De verpleegkundige vertelt dat de symptomen wisselen in de loop van de dag.

Welk klinisch gegeven levert de belangrijkste aanwijzing dat er, naast de dementie, ook sprake is van een delier?

- wisselende beloop
 desoriëntatie
 onrust
 verwardheid

IF choice a. is selected
Set score to 1

Goed.

2 of 51Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Mevrouw D., 85 jaar, wordt opgenomen op de afdeling interne geneeskunde vanwege een urineweginfectie. Zij is bekend met de ziekte van Parkinson en dementie.
Op de afdeling is zij verward, gedesoriënteerd in tijd en plaats, en onrustig. De verpleegkundige vertelt dat de symptomen wisselen in de loop van de dag.

Vervolg vorige vraag

Welk antipsychoticum is relatief gecontra-indiceerd bij mevrouw D.?

- risperidone
 haloperidol
 quetiapine
 olanzapine

IF choice b. is selected
Set score to 1

Goed.

3 of 51Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Mevrouw D., 85 jaar, wordt opgenomen op de afdeling interne geneeskunde vanwege een urineweginfectie. Zij is bekend met de ziekte van Parkinson en dementie.
Op de afdeling is zij verward, gedesoriënteerd in tijd en plaats, en onrustig. De verpleegkundige vertelt dat de symptomen wisselen in de loop van de dag.

Vervolg vorige vraag

U besluit mevrouw D. in te stellen op clozapine en start met een lage dosering.
Welke bijwerking dient u door middel van labcontroles te monitoren?

- verlaagd hemoglobine

- agranulocytose
- hepatomalacie
- verhoogd prolactine

IF choice b. is selected
Set score to 1

Goed.

4 of 51

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Mevrouw M., 70 jaar, wordt aangehouden naar aanleiding van een winkeldiefstal. Volgens echtgenoot heeft zij 4 weken daarvoor ook al geld ontvreemd van familieleden. Dit gedrag heeft zij nooit eerder vertoond. Toen hij haar daar toen mee confronteerde reageerde ze onverschillig. Echt boos wordt ze al tijden niet meer. Ze vertoont sinds een jaar dwangmatig poetsgedrag. Verward is zij volgens echtgenoot niet. Ze ziet of hoort ook geen rare dingen en er bestaan geen taalstoornissen.

Er is bij mevrouw M. waarschijnlijk sprake van

- frontotemporale dementie
- dementie met lewylichaampjes
- een delier
- Alzheimerdementie
- de ziekte van Parkinson

IF choice a. is selected
Set score to 1

Goed.

5 of 51

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Mevrouw M., 70 jaar, wordt aangehouden naar aanleiding van een winkeldiefstal. Volgens echtgenoot heeft zij 4 weken daarvoor ook al geld ontvreemd van familieleden. Dit gedrag heeft zij nooit eerder gedrag vertoond. Toen hij haar daar toen mee confronteerde reageerde ze onverschillig. Echt boos wordt ze al tijden niet meer. Ze vertoont sinds een jaar dwangmatig poetsgedrag. Verward is zij volgens echtgenoot niet. Ze ziet of hoort ook geen rare dingen en er bestaan geen taalstoornissen.

Vervolg vorige vraag

Na onvoldoende effect van een behandeling met een cholinesteraseremmer, wordt mevrouw M. opgenomen in het verpleegtehuis. Een verzorgster vraagt de arts waarom dit nodig was, mevrouw is op de afdeling immers prima te hanteren.

Wat blijkt uit onderzoek de grootste belasting voor de mantelzorger te zijn?

- cognitieve achteruitgang
- de apathie
- ontwikkeling van wanen en/of hallucinatoir gedrag
- het ontremde gedrag

IF choice b. is selected
Set score to 1

Goed.

6 of 51

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Je bent in het Amsterdamse Bos en ziet dhr A., 75 jaar lopen. Hij loopt alleen en ziet er mager en verwilderd uit. Als je hem aanspreekt reageert hij pas na enige tijd. Hij lijkt soms wat afgeleid. Als je hem vraagt of je iemand voor hem kan bellen zegt hij dat zijn vrouw is overleden. Je vraagt of hij kinderen heeft, waarop

hij zegt dit niet te weten.

Hoe lang hij al in het park is weet hij ook niet. Hij geniet niet meer van het zomerweer en van zijn hobby (vissen).

Welke psychiatrische symptomen worden beschreven in deze casus?

- anhedonie en bradyfrenie
- afasie en een somber affect
- agnosie en apathie
- alogie en disperceptie

IF choice a. is selected
Set score to 1

Goed.

7 of 51

Security Briefing : Briefing

LC : y

Test name : Test 1 or 2

Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

Je bent in het Amsterdamse Bos en ziet dhr A., 75 jaar lopen. Hij loopt alleen en ziet er mager en verwilderd uit. Als je hem aanspreekt reageert hij pas na enige tijd.

Hij lijkt soms wat afgeleid. Als je hem vraagt of je iemand voor hem kan bellen zegt hij dat zijn vrouw is overleden. Je vraagt of hij kinderen heeft, waarop hij zegt dit niet te weten.

Hoe lang hij al in het park is weet hij ook niet. Hij geniet niet meer van het zomerweer en van zijn hobby (vissen).

Vervolg vorige vraag

Je maakt je zorgen over dhr A. en loopt samen met hem naar de VUmc huisartsenpost. Na lichamelijk onderzoek besluit de huisarts de psychiater in te schakelen.

De psychiater vindt dat de heer A. vanwege de verdenking op een psychiatrische ziekte met bijkomend gevaar moet worden opgenomen middels een Inbewaringstelling (IBS) in de Valeriuskliniek (GGZ instelling met BOPZ aanmerking).

Wat is waar met betrekking tot een gedwongen opname van de heer A.?

De heer A. kan

- zonder tussenkomst van een burgemeester worden opgenomen
- pas na vaststellen van een psychiatrische stoornis worden opgenomen
- zonder tussenkomst van een rechter worden opgenomen
- vanwege zijn leeftijd niet middels een IBS worden opgenomen

IF choice c. is selected
Set score to 1

Goed.

8 of 51

Security Briefing : Briefing

LC : y

Test name : Test 1 or 2

Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

Je bent in het Amsterdamse Bos en ziet dhr A., 75 jaar lopen. Hij loopt alleen en ziet er mager en verwilderd uit. Als je hem aanspreekt reageert hij pas na enige tijd.

Hij lijkt soms wat afgeleid. Als je hem vraagt of je iemand voor hem kan bellen zegt hij dat zijn vrouw is overleden. Je vraagt of hij kinderen heeft, waarop hij zegt dit niet te weten.

Hoe lang hij al in het park is weet hij ook niet. Hij geniet niet meer van het zomerweer en van zijn hobby (vissen).

Vervolg vorige vraag

Je maakt je zorgen over dhr A. en loopt samen met hem naar de VUmc huisartsenpost. Na lichamelijk onderzoek besluit de huisarts de psychiater in te schakelen.

De psychiater vindt dat de heer A. vanwege de verdenking op een psychiatrische ziekte met bijkomend gevaar moet worden opgenomen middels een Inbewaringstelling (IBS) in de Valeriuskliniek (GGZ instelling met BOPZ aanmerking).

Vervolg vorige vraag

Tijdens opname wordt dhr A. behandeld met electroconvulsieve therapie (ECT).

De frequentie en duur van een gemiddelde ECT-behandeling is

- 2x per week en gemiddeld 6-9 weken
- 1x per 2 weken en gemiddeld 18 weken

1x per week en gemiddeld 18 weken

IF choice a. is selected
Set score to 1

Goed.

9 of 51

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Dhr J., 23 jaar, is opgenomen op de Intensive Care van een GGZ instelling. Hij is blootvoets roepend aangetroffen op straat; hij wilde op blote voeten naar Egypte lopen.

Tot een jaar geleden studeerde hij fiscaal recht aan de universiteit; in 4.5 jaar heeft hij zijn Bachelor gehaald.

Het afgelopen jaar lukte het niet om verder te studeren in de Master, of om werk te vinden. In zijn studentenhuus is hij steeds stiller en eenzamer geworden.

Volgens zijn broer toonde hij lange tijd maar weinig emoties. Als je hem nu spreekt, kan hij niet uitleggen waarom hij op blote voeten zijn tocht wilde uitvoeren.

Hij vertelt dat hij naar de politie ging voor hulp, "maar toen vond er een terechtstelling plaats".

Je denkt aan schizofrenie. Wat is waar ten aanzien van de diagnostiek?

Voor het stellen van de diagnose

- dient affectieve vervlakking tenminste 1 maand aanwezig te zijn.
- is de duur van de beschreven klachten onvoldoende.
- zijn hallucinaties essentieel om de diagnose te stellen.
- moeten er tenminste 2 maanden wanen aanwezig zijn.

IF choice a. is selected
Set score to 1

Goed.

10 of 51

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

De heer T., 36 jaar, heeft al enkele jaren last van wanen en leidt een teruggetrokken bestaan.

Hij heeft al verschillende behandelingen ondergaan en ook al verschillende antipsychotica voorgeschreven gekregen, maar zijn klachten blijven bestaan.

Zijn psychiater besluit hem clozapine voor te schrijven.

Wat is de belangrijkste reden om voor clozapine te kiezen?

Clozapine

- heeft een minder sederend effect dan andere antipsychotica.
- is werkzaam in behandelingsresistente patiënten.
- heeft een lagere affiniteit voor serotonine 5-HT2 receptoren.
- geeft een sterkere blokkade van dopamine D2 receptoren.

IF choice b. is selected
Set score to 1

Goed.

11 of 51

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Psychiatrische stoornissen kennen een genetische variatie.

Tussen welke twee psychiatrische stoornissen bestaat de grootste overlap in tot nu toe gevonden genetische varianten?

Schizofrenie en

- bipolaire stoornis
- depressie
- autisme
- ADHD

IF choice a. is selected
Set score to 1

Goed.

12 of 51

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Welk symptoom / welke symptomen worden in het psychiatrisch onderzoek ondergebracht bij de affectieve functies?
Er zijn meerdere antwoorden mogelijk.

- dranggedachten
- geheugenklachten
- innerlijk gespannen zijn
- somatisch niet verklaarde klachten

IF choice a. is NOT selected
AND choice b. is NOT selected
AND choice c. is selected
AND choice d. is selected
Set score to 1

Goed.

Anything else
No score defined.

Fout.

Juiste antwoord:

- innerlijk gespannen zijn
- somatisch niet verklaarde klachten

13 of 51

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Een studente voelt zich tijdens de menstruatie altijd erg naar. Ze vraagt zich af of ze misschien een premenstruele stemmingsstoornis heeft. Uit de anamnese door de huisarts komen de volgende klachten naar voren: ze voelt zich tijdens de menstruatie altijd gespannen en prikkelbaar. Daarnaast heeft ze ook diverse lichamelijke klachten (gevoelige borsten en spierpijn). Voldoet zij hiermee aan de diagnose premenstruele stemmingsstoornis?

- nee
- ja

IF choice a. is selected
Set score to 1

Goed.

14 of 51

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

U bent huisarts. De heer P., 40 jaar, is sinds 2 weken somber en beleeft geen plezier meer aan zijn werk, relatie en hobby's. Hij heeft nergens meer fut voor, slaapt ook slecht en hij heeft het gevoel dat hij waardeloos is. Zijn zus is is gediagnosticeerd met een bipolaire stoornis. Wat is volgens DSM-5 het verschil tussen een depressieve episode die optreedt bij een unipolaire stemmingsstoornis versus een bipolaire stemmingsstoornis?

- Bij een unipolaire depressie komen in tegenstelling tot bij de bipolaire depressie nooit aanvullende manische symptomen voor.
- De DSM-5 criteria voor de unipolaire depressie en de bipolaire depressie zijn hetzelfde.

IF choice b. is selected
Set score to 1

Goed.

15 of 51

Security Briefing : Briefing

LC : y

Test name : Test 1 or 2

Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

U bent huisarts. De heer P., 40 jaar, is sinds 2 weken somber en beleeft geen plezier meer aan zijn werk, relatie en hobby's. Hij heeft nergens meer fut voor, slaapt ook slecht en hij heeft het gevoel dat hij waardeloos is. Zijn zus is bekend met een bipolaire stoornis.

Vervolg vorige vraag

Naast het starten van ondersteunende gesprekken bij de praktijkverpleegkundige heeft de heer P. de wens om te starten met een antidepressivum. U overweegt om een SSRI te starten, maar wilt eerst nagaan of er geen contra-indicaties bestaan. Wat is een contra-indicatie om te starten?

- verlengd QT-interval
 - recent myocardinfarct
 - ziekte van Parkinson
 - urineretentie
-

IF choice a. is selected
Set score to 1

Goed.

16 of 51

Security Briefing : Briefing

LC : y

Test name : Test 1 or 2

Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

U bent huisarts. De heer P., 40 jaar, is sinds 2 weken somber en beleeft geen plezier meer aan zijn werk, relatie en hobby's. Hij heeft nergens meer fut voor, slaapt ook slecht en hij heeft het gevoel dat hij waardeloos is. Zijn zus is bekend met een bipolaire stoornis.

Vervolg vorige vraag

Naast het starten van ondersteunende gesprekken bij de praktijkverpleegkundige heeft de heer P. de wens om te starten met een antidepressivum. U overweegt om een SSRI te starten, maar wilt eerst nagaan of er geen contra-indicaties bestaan.

Vervolg vorige vraag

De heer P. werd ingesteld op een SSRI, waarmee de klachten leken af te nemen. Vijf jaar later maakt de heer P. vanwege terugkerende somberheid en lusteloosheid opnieuw een afspraak met zijn behandelaar. Deze besluit hem opnieuw een geneesmiddel voor te schrijven. Welk van de volgende geneesmiddelen zal de behandelaar de heer P. in eerste instantie voorschrijven?

- nortriptyline
 - amitriptyline
 - paroxetine
 - moclobemide
-

IF choice c. is selected
Set score to 1

Goed.

17 of 51

Security Briefing : Briefing

LC : y

Test name : Test 1 or 2

Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

De serotonine-bevattende vezels in de cortex hebben hun cellichamen in:

- het ventrale tegmentum gebied (VTA)
 - de raphe kernen
 - de locus coeruleus
 - de substantia nigra
-

IF choice b. is selected

Set score to 1

Goed.

18 of 51

Security Briefing : Briefing

LC : y

Test name : Test 1 or 2

Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

Bij de behandeling van depressie vinden MAO-remmers nauwelijks nog toepassing, vanwege het mogelijk optreden van:

- neurotoxiciteit
- psychose
- metabool syndroom
- hypertensie

IF choice d. is selected

Set score to 1

Goed.

19 of 51

Security Briefing : Briefing

LC : y

Test name : Test 1 or 2

Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

Mevrouw L., 30 jaar, is 2 weken geleden haar baan kwijtgeraakt. Haar zus trekt bij de huisarts aan de bel omdat mevrouw L. sinds een week nauwelijks meer slaapt.

Ze is op advies van haar zus iets van de drogist gaan gebruiken, zonder effect. In de voorgeschiedenis is mevrouw L. verder bekend met diabetes mellitus type I, de ziekte van Crohn en migraine.

Mevrouw L. maakt zich totaal geen zorgen om het slaapgebrek, maar komt eerder geïrriteerd over in het gesprek, omdat ze naar eigen zeggen haar tijd liever gebruikt voor 4 sollicitatiegesprekken die ze deze week nog heeft.

Ze spreekt snel en switcht tussen het ene en andere onderwerp.

Welk farmacon kan de symptomen van mevrouw L. veroorzaken?

- corticosteroiden
- insuline
- melatonine
- betablokkers

IF choice a. is selected

Set score to 1

Goed.

20 of 51

Security Briefing : Briefing

LC : y

Test name : Test 1 or 2

Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

Mevrouw L., 30 jaar, is 2 weken geleden haar baan kwijtgeraakt. Haar zus trekt bij de huisarts aan de bel omdat mevrouw L. sinds een week nauwelijks meer slaapt.

Ze is op advies van zus iets van de drogist gaan gebruiken, zonder effect. In de voorgeschiedenis is mevrouw L. verder bekend met diabetes mellitus type I, de ziekte van Crohn en migraine.

Mevrouw L. maakt zich totaal geen zorgen om het slaapgebrek, maar komt eerder geïrriteerd over in het gesprek, omdat ze naar eigen zeggen haar tijd liever gebruikt voor 4 sollicitatiegesprekken die ze deze week nog heeft.

Ze spreekt snel en switcht tussen het ene en andere onderwerp.

Vervolg vorige vraag

Bij mevrouw L. blijken de symptomen uiteindelijk los te staan van haar medicatie. Ze wordt met succes medicamenteus behandeld, waardoor een opname kan worden afgewend.

Wat is, gegeven de balans tussen effectiviteit en nevenwerkingen, het eerste keuze middel voor de onderhoudsbehandeling van haar stoornis?

- olanzapine
- valproïnezuur
- lamotrigine
- lithium

IF choice d. is selected

Set score to 1

Goed.

21 of 51

Security Briefing : Briefing

LC : y

Test name : Test 1 or 2

Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

Dhr W., 48 jaar, komt bij een psychiater met de klacht dat hij last heeft van spanningen die hem ernstig belemmeren bij zijn dagelijkse activiteiten. Hij heeft voortdurend zorgen of hij zijn baan wel behoudt, over zijn gezondheid, over het opvoeden van de kinderen en het op tijd zijn voor afspraken. Hij heeft het gevoel "gek" te worden. De psychiater vraagt zich af of cognitieve gedragstherapie een mogelijke behandeloptie is, en besluit een G-schema te toetsen.

"Ik heb het gevoel gek te worden" valt onder de G van

- gebeurtenis
- gedachte
- gevoel
- gedrag

IF choice b. is selected

Set score to 1

Goed.

22 of 51

Security Briefing : Briefing

LC : y

Test name : Test 1 or 2

Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

Dhr W., 48 jaar, komt bij een psychiater met de klacht dat hij last heeft van spanningen die hem ernstig belemmeren bij zijn dagelijkse activiteiten. Hij heeft voortdurende zorgen of hij zijn baan wel behoudt, over zijn gezondheid, over het opvoeden van de kinderen en het op tijd zijn voor afspraken. Hij heeft het gevoel "gek" te worden. De psychiater vraagt zich af of cognitieve gedragstherapie een mogelijke behandeloptie is, en besluit een G-schema te toetsen.

Vervolg vorige vraag

Na een uitvoerig gesprek concludeert de psychiater dat dhr. W. lijdt aan een gegeneraliseerde angststoornis en besluit hem het geneesmiddel buspiron voor te schrijven.

Via welke receptoren oefent buspiron zijn werking uit in de hersenen?

Er bestaat een partiële activatie van

- GABA-A receptoren
- GABA-B receptoren
- serotonine 5-HT1A receptoren
- dopamine D1 receptoren

IF choice c. is selected

Set score to 1

Goed.

23 of 51

Security Briefing : Briefing

LC : y

Test name : Test 1 or 2

Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

Dhr W., 48 jaar, komt bij een psychiater met de klacht dat hij last heeft van spanningen die hem ernstig belemmeren bij zijn dagelijkse activiteiten. Hij heeft voortdurende zorgen of hij zijn baan wel behoudt, over zijn gezondheid, over het opvoeden van de kinderen en het op tijd zijn voor afspraken. Hij heeft het gevoel "gek" te worden. De psychiater vraagt zich af of cognitieve gedragstherapie een mogelijke behandeloptie is, en besluit een G-schema te toetsen.

Vervolg vorige vraag

Na een uitvoerig gesprek concludeert de psychiater dat de man lijdt aan een gegeneraliseerde angststoornis en besluit hem het geneesmiddel buspiron voor te schrijven.

Vervolg vorige vraag

Een week later meldt dhr W. zich weer bij de psychiater met de mededeling dat hij nog steeds veel last heeft van zijn algemene gevoelens van angst ondanks dat hij buspiron elke dag trouw heeft ingenomen.

Welk besluit verwacht u dat de psychiater neemt ten aanzien van de behandeling van deze patiënt?

- in plaats van buspiron een SSRI voorschrijven
- de behandeling ongewijzigd laten
- een benzodiazepine voorschrijven
- de dosering buspiron verdubbelen

IF choice b. is selected
Set score to 1

Goed.

24 of 51

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

In welk hersengebied verwacht u met name toegenomen activiteit gemeten met functionele MRI als u een proefpersoon in de scanner afbeeldingen toont van mensen met agressieve gelaatsuitdrukkingen?

- orbitofrontale cortex
- hippocampus
- amygdala
- thalamus
- cingulaire cortex

IF choice c. is selected
Set score to 1

Goed.

25 of 51

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Tot welk cluster in de DSM 5 behoren onderstaande persoonlijkheidsstoornissen?

- a. Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis A B C
- b. Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis A B C
- c. Narcistische persoonlijkheidsstoornis A B C
- d. Paranoïde persoonlijkheidsstoornis A B C

IF choice a.(iii) is selected
AND choice b.(iii) is selected
AND choice c.(ii) is selected
AND choice d.(i) is selected
Add 1 to score. Continue evaluating.

Goed.

Anything else
No score defined.

Fout.

Juiste antwoord:
Afhankelijke persoonlijkheidsstoornis (C)
Dwangmatige persoonlijkheidsstoornis (C)
Narcistische persoonlijkheidsstoornis (B)
Paranoïde persoonlijkheidsstoornis (A)

26 of 51

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Op de verpleegafdeling longziekten wordt u als psychiater in consult gevraagd door de longarts i.v.m. samenwerkingsproblemen van de verpleegkundigen met een mannelijke patiënt.
Het betreft de heer G., 45 jaar oud. Hij lacht en huilt in hetzelfde gesprek, heeft een slechte impulsbeheersing en uitbarstingen van agressie of woede, die niet in verhouding staan tot de prikkel.

U noteert in de status mentalis dat er sprake is van

- een labiel en inadequaat affect
- misidentificatie met congruent affect
- tachyfrenie en een modulerend affect
- incoherentie en een incongruent affect

IF choice a. is selected
Set score to 1

Goed.

27 of 51

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Op de verpleegafdeling longziekten wordt u als psychiater in consult gevraagd door de longarts i.v.m. samenwerkingsproblemen van de verpleegkundigen met een mannelijke patiënt.
Het betreft de heer G., 45 jaar oud. Hij lacht en huilt in hetzelfde gesprek, heeft een slechte impulsbeheersing en uitbarstingen van agressie of woede, die niet in verhouding staan tot de prikkel.

Vervolg vorige vraag

Door de verpleegkundige worden bij de heer de G. ook periodes beschreven van apathie, achterdocht en paranoïde ideeën. Er is in de afgelopen 24 uur geen sprake geweest van een gedaald bewustzijn.
Welke stoornissen mogen niet ontbreken in uw differentiaaldiagnose?
Kies er vier uit de volgende opsomming:

- bipolaire stemmingsstoornis
- borderline persoonlijkheidsstoornis
- delier
- persoonlijkheidsverandering door somatische aandoening
- schizotypische persoonlijkheidsstoornis
- verstandelijke beperking

IF choice a. is selected
AND choice b. is selected
AND choice c. is NOT selected
AND choice d. is selected
AND choice e. is NOT selected
AND choice f. is selected
Set score to 1

Goed.

Anything else
No score defined.

Fout.

Juiste antwoord:

- borderline persoonlijkheidsstoornis
- bipolaire stemmingsstoornis
- persoonlijkheidsverandering door somatische aandoening
- verstandelijke beperking

28 of 51

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Op de verpleegafdeling longziekten wordt u als psychiater in consult gevraagd door de longarts i.v.m. samenwerkingsproblemen van de verpleegkundigen met een mannelijke patiënt.
Het betreft de heer G., 45 jaar oud. Hij lacht en huilt in hetzelfde gesprek, heeft een slechte impulsbeheersing en uitbarstingen van agressie of woede, die niet in verhouding staan tot de prikkel.

Vervolg vorige vraag

Door de verpleegkundige worden bij de heer de G. ook periodes beschreven van apathie, achterdocht en paranoïde ideeën. Er is in de afgelopen 24 uur geen sprake geweest van een gedaald bewustzijn.

Vervolg vorige vraag

De heer G. vertelt dat zijn vrouw recentelijk vreemd is gegaan met een andere man. De zaalarts reageert snel: 'Aha, u bent nu boos op haar!'

In welke valkuil trapt de arts hier?

- willen oplossen
 - ontkrachten
 - niet specifieke geruststelling
 - te snelle identificatie
 - de ander gevoelens toedichten
 - vluchten in feiten
-

IF choice e. is selected
Set score to 1

Goed.

29 of 51

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Mw T., 32 jaar, komt bij u als huisarts. Ze is onverwachts zwanger na een one-night stand met een collega. Ze heeft het nog niemand verteld en verwacht weinig begrip van haar omgeving; ze is net weer aan het werk na 4 jaar werkeloos te zijn geweest. Haar moeder heeft een bipolaire stoornis. Ze vraagt u of ze een verhoogde kans heeft op psychiatrische problemen in de zwangerschap.

Zij heeft

- a. een verhoogde kans op een depressie ja nee
 - b. een verhoogde kans op een psychose ja nee
-

IF choice a.(i) is selected
AND choice b.(i) is selected
Add 1 to score. Continue evaluating.

Goed.

Anything else
No score defined.

Fout.

Juiste antwoord:
een verhoogde kans op een depressie - **ja**
een verhoogde kans op een psychose - **ja**

30 of 51

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

60% van de psychiatrische patiënten heeft een of meerdere persoonlijkheidsstoornis(sen) naast een psychiatrische stoornis. Om een vergelijkbare klachtenreductie van de comorbide psychiatrische stoornis te bereiken, geldt het volgende:

De behandeling voor de psychiatrische comorbide stoornis:

- duurt even lang
 - duurt 2x zo lang
 - wordt 2x vaker afgebroken
 - wordt even vaak afgebroken
-

IF choice b. is selected
Set score to 1

Goed.

31 of 51

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

De 24-jarige Bob vertelt dat hij een stuk van de tijd kwijt is. Hij weet niet meer goed wat hij op een dag heeft gedaan. Bij doorvragen vertelt hij dat hij op de bank zat en dat het ineens een paar uur later was. Hij voelde zich van streek door een ruzie met een vriend. Als hij goed probeert weet hij wel dat hij een kop thee heeft gemaakt en dat hij de neiging had zichzelf te verwonden met een scheermesje.

Wat is de meest waarschijnlijke diagnose:

- depressieve stoornis
- cognitieve stoornis NAO
- borderline persoonlijkheidsstoornis
- dissociatieve identiteitsstoornis

IF choice c. is selected
Set score to 1

Goed.

32 of 51

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Je stelt psychotherapie voor als behandeling voor een posttraumatische stressstoornis. Je hebt de keuze tussen cognitieve gedragstherapie met exposure en EMDR.

Waarop baseer je je keuze?

- Je kiest op basis van het werkgeheugen van de patiënt
- Je laat de patiënt kiezen, beide zijn even effectief
- Je kiest de effectiefste behandeling van de twee
- Je kiest op basis van het type trauma

IF choice b. is selected
Set score to 1

Goed.

33 of 51

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Nadat een jongen van 12 jaar hevig heeft moeten braken bij een buikgriep, durft hij niet goed meer te eten, omdat hij voortdurend bang is misselijk te worden en opnieuw over te moeten geven. De klachten bestaan zes maanden. De jongen heeft in deze zes maanden niet meer overgegeven en is 5 kg afgefallen in gewicht, waardoor zijn BMI nu 18 is. Hij ziet er tegen op om naar school te gaan. Hij kan moeilijk zijn aandacht bij zijn schoolopgaven houden en is bang om op school te moeten braken.

De casus wijst op een psychiatrisch syndroom. Dat is echter niet volledig beschreven. Aan welk syndroom of welke syndromen moet de coassistent differentiaal diagnostisch denken?

- anorexia nervosa en obsessief compulsieve stoornis
- specifieke fobie en obsessief compulsieve stoornis
- specifieke fobie en anorexia nervosa

IF choice b. is selected
Set score to 1

Goed.

34 of 51

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Mw. K., 25 jaar, ontwikkelt een paniekstoornis en een agorafobie.
Welke twee aspecten zeggen iets over de ernst van deze specifieke aandoeningen?

- frequentie paniekaanvallen
- hoe lang de aandoening bestaat
- mate waarin de vrouw aan huis gebonden is
- of er een somatische oorzaak bestaat
- of er sprake is van onttrekking van psychoactieve middelen

IF choice a. is selected
AND choice b. is NOT selected
AND choice c. is selected
AND choice d. is NOT selected
AND choice e. is NOT selected
Set score to 1

Goed.

Anything else
No score defined.

Fout.

Juiste antwoord:

- frequentie paniekaanvallen
- mate waarin de vrouw aan huis gebonden is

35 of 51

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Dhr E., 18 jaar, rookt al twee jaar dagelijks hasjesj. Hoewel de hasjesj hem rust en kalmte brengt, merkt hij ook op dat hij tussen het roken door steeds angstiger wordt.

Hij stopt het roken van hasjes, maar blijft overdreven angstig. Zijn hersenvreessysteem is gevoeliger geworden dan dat het voor zijn 16e jaar was en geeft sneller een angstrespons.

Het overgevoelige hersenvreessysteem is:

1. de oorzaak van zijn angst
2. het correlaat van zijn angst
3. het gevolg van zijn angst

- 1 en 2 zijn goed
- 1 en 3 zijn goed
- 2 en 3 zijn goed

IF choice a. is selected
Set score to 1

Goed.

36 of 51

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Dhr P., 36 jaar, komt bij de huisarts met dwanggedachten en dwanghandelingen. Deze klachten bestaan 6 maanden. De huisarts vermoedt een psychiatrische stoornis.

Op basis van comorbiditeits-patronen die gevonden zijn bij onderzoek in de algemene bevolking moet hij bij deze man bedacht zijn op de aanwezigheid van een of meer andere psychiatrische stoornissen.

Welke twee stoornissen zijn dat?

- antisociale persoonlijkheidsstoornis
- bipolaire stoornissen
- depressieve stoornis
- fobieën
- gegeneraliseerde angststoornis
- paniekstoornis
- persistente depressieve stoornis
- schizofrenie

IF choice a. is NOT selected
AND choice b. is NOT selected
AND choice c. is NOT selected
AND choice d. is selected
AND choice e. is NOT selected
AND choice f. is selected
AND choice g. is NOT selected
AND choice h. is NOT selected
Set score to 1

Goed.

Anything else
No score defined.

Fout.

Juiste antwoord:

- fobieën
- paniekstoornis

37 of 51

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Mw. J., 38 jaar, komt op uw spreekuur. U bent huisarts. Zij is een beruchte kettingrookster die na vele stoppogingen besloten heeft een dokter te raadplegen om definitief met roken te kunnen stoppen.
U schrijft haar een geneesmiddel voor ter ondersteuning.
Vraag: Welk geneesmiddel gaat u haar voorschrijven?

- fluoxetine
- naltrexon
- disulfiram
- varenicline

IF choice d. is selected
Set score to 1

Goed.

38 of 51

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Onderzoek onder tweelingen naar de overerfbaarheid van roken en rookgedrag heeft laten zien dat zowel genetische als omgevingsfactoren een rol spelen, maar dat deze rol afhangt van de fase van de rookverslaving.
Welke factoren spelen de belangrijkste rol bij nicotine-afhankelijkheid?

- met name omgevingsfactoren
- met name genetische factoren
- genetische- en omgevingsfactoren in gelijke mate

IF choice b. is selected
Set score to 1

Goed.

39 of 51

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Langdurig gebruik van benzodiazepinen kan, naast het optreden van tolerantie en afhankelijkheid, leiden tot:

- obstipatie en libidoverlies
- vermoeidheid en amnesie
- ademhalingsdepressie en diarree
- verminderde eetlust en depressie

IF choice b. is selected
Set score to 1

Goed.

40 of 51

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

De cannabisreceptoren die na activatie zorgen voor een verhoogde afgifte van dopamine in de nucleus accumbens bevinden zich voornamelijk:

- op GABA-erge neuronen in het ventrale tegmentum (VTA)
- op GABA-erge neuronen in de nucleus accumbens
- op dopaminerge neuronen in het ventrale tegmentum (VTA)
- op dopaminerge neuronen in de nucleus accumbens

IF choice a. is selected
Set score to 1

Goed.

41 of 51

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Metamfetamine en cocaïne horen beide tot de groep van psychostimulantia. Beide stoffen remmen de heropname van dopamine.
De effecten van metamfetamine op de dopamine neurotransmissie zijn echter sterker dan die van cocaïne omdat metamfetamine ook zorgt voor:

- een toename van de dopamine afgifte
- een toename van de dopamine synthese
- blokkade van dopamine autoreceptoren
- directe activatie van dopamine receptoren


IF choice a. is selected
Set score to 1

Goed.

42 of 51

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Figuur 1



Originele bron afbeelding: anatomie en neurowetenschappen

Zie figuur 1
Welke vier tot de basale ganglia behorende structuren zijn zichtbaar in deze figuur?
Vink alle juiste antwoorden aan.

- globus pallidus externa
 globus pallidus interna
 nucleus caudatus
 nucleus subthalamicus
 putamen
 substantia nigra

IF choice a. is selected
 AND choice b. is selected
 AND choice c. is selected
 AND choice d. is NOT selected
 AND choice e. is selected
 AND choice f. is NOT selected
 Set score to 1

Goed.

Anything else
 No score defined.

Fout.

Juiste antwoord:

- globus pallidus externa
- globus pallidus interna
- nucleus caudatus
- putamen

43 of 51

Security Briefing : Briefing
 LC : y
 Test name : Test 1 or 2
 Difficulty : CTT Level
 PorterGamGad : include

Stelling: De kenmerken van een persisterende depressie verschillen bij kinderen in vergelijking tot volwassenen doordat de duur van de depressieve stemming bij kinderen 1 in plaats van 2 jaar is en de stemming zich vaak uit door prikkelbaarheid.

- juist
 onjuist

IF choice a. is selected
Set score to 1

Goed.

44 of 51

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Sergei van 9 jaar oud kom bij u vanwege een eetprobleem. Zijn ouders geven aan dat hij alleen maar wit eten wil eten. Dit beperkt zijn dieet aanzienlijk. Vooral groenten zijn een probleem, waardoor hij bijna elke dag bloemkool eet. Als er iets van kleur op zijn bord verschijnt, raakt hij overstuur en knijpt zijn ogen stijf dicht.

De laatste tijd wordt hij zelfs boos als er een dag geen bloemkool, maar bijvoorbeeld asperges op het menu staan.

Welke twee symptomen van autisme herkent u in deze casus?

- angst
- beperkingen in non-verbale communicatie
- cognitieve beperkingen
- oppositioneel gedrag
- rigiditeit
- sensorische hypersensitiviteit
- sociaal-emotionele beperkingen

IF choice a. is NOT selected
AND choice b. is NOT selected
AND choice c. is NOT selected
AND choice d. is NOT selected
AND choice e. is selected
AND choice f. is selected
AND choice g. is NOT selected
Set score to 1

Goed.

Anything else
No score defined.

Fout.

Juiste antwoord:

- rigiditeit
- sensorische hypersensitiviteit

45 of 51

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Fjort is net gestart in groep 3 van de basisschool. Tijdens het eerste rapportgesprek blijkt dat het niet zo goed gaat met hem op school. Het rekenen doet hij uitstekend, bovengemiddeld zelfs, maar taal is moeilijker. Daar komt bij dat zijn handschrift erg slecht is, meestal weigert hij eenvoudigweg te schrijven.

In de klas ziet de leerkracht dat hij de hele dag zacht prevelend aan het hoofdrekenen is. Dit belemmert hem ook in het contact met klasgenoten, omdat hij niet mee wil doen met de spelletjes die zij spelen.

Hij heeft geen vriendjes in de klas.

Wat voor onderzoek gaat u doen?

- intelligentie onderzoek
- neurologisch onderzoek
- ontwikkelingsanamnestisch onderzoek
- MRI onderzoek

IF choice c. is selected
Set score to 1

Goed.

46 of 51

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

Als net 13-jarige heeft Dirk al veel meegemaakt. Hij is meerdere malen geplaatst bij nieuwe opvoed/pleeg-ouders. Recent is het ook bij zijn oom geëscaleerd.
Dirk hield zich niet meer aan regels, loog vaak om verplichtingen te ontlopen, kwam 's avonds en 's nachts vaak niet op tijd thuis en is met politie in contact geweest.
Op school pest en intimideert hij vaak anderen en is hij vaak licht geraakt, boos en ontevreden.

Welke drie kenmerken passen bij een (normoverschrijdende) gedragsstoornis.

- kwam 's avonds en 's nachts vaak niet op tijd thuis
 licht geraakt, boos en ontevreden
 loog vaak om verplichtingen te ontlopen
 niet houden aan regels
 vaak pesten van anderen

IF choice a. is selected
 AND choice b. is NOT selected
 AND choice c. is selected
 AND choice d. is NOT selected
 AND choice e. is selected
 Set score to 1

Goed.

Anything else
 No score defined.

Fout.

Juiste antwoord:

- kwam 's avonds en 's nachts vaak niet op tijd thuis
- loog vaak om verplichtingen te ontlopen
- vaak pesten van anderen

47 of 51

Security Briefing : Briefing
 LC : y
 Test name : Test 1 or 2
 Difficulty : CTT Level
 PorterGamGad : include

David is een 14-jarige jongen die sinds twee jaar op het speciaal voortgezet onderwijs zit. Hij geeft in gesprek met zijn tutor aan dat hij onder zijn niveau les krijgt, hoewel hij op toetsen onvoldoendes haalt. Hij belandt regelmatig in vechtpartijen, waar volgens hem anderen schuldig aan zijn. Regelmatig weigert hij te doen wat een leraar vraagt. Als het gezellig is in de klas geeft hij aan profvoetballer te willen en kunnen worden, hoewel hij nu nog niet op een voetbalclub zit.
Aan welke diagnose denkt u het meest?

- narcistische persoonlijkheidsstoornis
 oppositioneel opstandige (gedrags)stoornis
 autisme spectrum stoornis
 leerstoornis

IF choice b. is selected
 Set score to 1

Goed.

48 of 51

Security Briefing : Briefing
 LC : y
 Test name : Test 1 or 2
 Difficulty : CTT Level
 PorterGamGad : include

Zoraya, 14 jaar, heeft een oppositioneel opstandige stoornis en ADHD.

In het adviesgesprek over de behandeling wordt voorgesteld te starten met een (i) gezinstherapie (ii) oudertraining en daarnaast (i) farmacotherapie (ii) training in sociale probleemoplossing .

IF choice a. matches "gezinstherapie"
 AND choice b. matches "farmacotherapie"
 Set score to 1

Goed.

Anything else
No score defined.

Fout.

Juiste antwoord:

In het adviesgesprek over de behandeling wordt voorgesteld te starten met een [gezinstherapie] en daarnaast [farmacotherapie].

49 of 51

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Zoraya, 14 jaar, heeft een oppositioneel opstandige stoornis en ADHD.

Vervolg vorige vraag

De kinderpsychiater bespreekt welke factoren van invloed zijn op de vastgestelde oppositionele-opstandige stoornis

Selecteer het juiste antwoord:

Bij kinderen met ODD, stijgt in reactie op stress de cortisolspiegel

- meer
 minder

IF choice b. is selected
Set score to 1

Goed.

50 of 51

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Sanne is een 15-jarige adolescente die sinds de overgang naar de middelbare school toenemend opstandig, mopperend en teruggetrokken gedrag heeft laten zien.

Ze werkt heel hard voor school, maar kan zich vaak moeilijk concentreren omdat ze veel piekert. Haar vroegere vrolijkheid lijkt verdwenen.

Ze wordt door kinderen in de klas, met wie ze weinig aansluiting heeft en die grapjes om haar maken, als 'studje' gezien, wat haar onzeker maakt.

Haar moeder heeft onlangs een gesprek met haar gevoerd waarin ze aangaf soms liever dood te willen zijn en de toekomst niet te zien zitten.

Moeder vindt haar een echte puber en vraagt zich af waarom ze niet meer vriendinnen heeft.

Wat is de hoofddiagnose van Sanne?

- specifieke leerstoornis
 angststoornis
 ADHD
 depressie
 oppositionele gedragsstoornis

IF choice d. is selected
Set score to 1

Goed.

51 of 51

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Tegen een psychiater wordt een klacht ingediend vanwege grensoverschrijdend gedrag. De tuchtcommissie acht de klacht gegrond en legt de volgende maatregel op: een geldboete van €3000 euro.

Zet de verschillende maatregelen in de goede volgorde. (Oplopend in zwaarte, waarbij de lichtste maatregel op 1 staat en de zwaarste maatregel op 6. Dus bij 1 de lichtst mogelijke maatregel, bij 6 de zwaarste).

- 1: (i) berisping (ii) doorhaling van de inschrijving in het BIG register (iii) gedeeltelijke ontzegging (iv) geldboete (v) schorsing van de inschrijving in het BIG register (vi) waarschuwing
- 2: (i) berisping (ii) doorhaling van de inschrijving in het BIG register (iii) gedeeltelijke ontzegging (iv) geldboete (v) schorsing van de inschrijving in het BIG register (vi) waarschuwing

- 3: (i) berisping (ii) doorhaling van de inschrijving in het BIG register (iii) gedeeltelijke ontzegging (iv) geldboete (v) schorsing van de inschrijving in het BIG register (vi) waarschuwing
- 4: (i) berisping (ii) doorhaling van de inschrijving in het BIG register (iii) gedeeltelijke ontzegging (iv) geldboete (v) schorsing van de inschrijving in het BIG register (vi) waarschuwing
- 5: (i) berisping (ii) doorhaling van de inschrijving in het BIG register (iii) gedeeltelijke ontzegging (iv) geldboete (v) schorsing van de inschrijving in het BIG register (vi) waarschuwing
- 6: (i) berisping (ii) doorhaling van de inschrijving in het BIG register (iii) gedeeltelijke ontzegging (iv) geldboete (v) schorsing van de inschrijving in het BIG register (vi) waarschuwing

IF choice a. matches "waarschuwing"
AND choice b. matches "berisping"
AND choice c. matches "geldboete"
AND choice d. matches "schorsing van de inschrijving in het BIG register"
AND choice e. matches "gedeeltelijke ontzegging"
AND choice f. matches "doorhaling van de inschrijving in het BIG register"
Set score to 1

Goed.

Anything else
No score defined.

Fout.

Juiste antwoord:
1: waarschuwing
2: berisping
3: geldboete
4: schorsing van de inschrijving in het BIG register
5: gedeeltelijke ontzegging
6: doorhaling van de inschrijving in het BIG register

Feedback
0% to 100%

Je hebt %SESSION.SCORE% van de %SESSION.MAX% vragen juist beantwoord.

