

VUmc_CAT_PFC_B15_2018-06-01_inzage

Friday, June 01, 2018 12:25

Block 1, az question(s), maximum score 52
CAT PFC B15 [01-06-2018] INZAGE**a of az**Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : includeAls een patiënt met een rechterlijke machtiging is opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis heeft dat een aantal gevolgen voor zijn rechtspositie. Welke twee gevolgen zijn juist?

- De patiënt mag alleen met verlof na toestemming van de geneesheer-directeur.
- De patiënt mag zijn woning/kamer niet verlaten zonder toestemming van de behandelaar.
- De patiënt mag niet meer bellen.
- Dwangmedicatie is een onderdeel van de rechterlijke machtiging.
- Toepassing van middelen of maatregelen mag alleen in geval van een noodsituatie.

IF choice a. is selected
AND choice b. is NOT selected
AND choice c. is NOT selected
AND choice d. is NOT selected
AND choice e. is selected
Set score to 1

Goed.

Anything else
No score defined.

Fout.

Juiste antwoord:

- De patiënt mag alleen met verlof na toestemming van de geneesheer-directeur.
- Toepassing van middelen of maatregelen mag alleen in geval van een noodsituatie.

b of azSecurity Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Welke rol heeft de rechter bij een rechterlijke machtiging?

De rol van de rechter bij een rechterlijke machtiging is: (i) de behandelaar ondervragen, aangezien de patiënt zelf vaak niet tot antwoorden in staat is (ii) uiteindelijk beslissen of een patiënt een RM krijgt .De hoorzitting (i) vindt altijd plaats in aanwezigheid van rechter, behandelaar en psychiater die de geneeskundige verklaring heeft opgesteld (ii) vindt altijd plaats in een rechtszaal .

IF choice a. matches "uiteindelijk beslissen of een patiënt een RM krijgt"
AND choice b. matches "vindt altijd plaats in aanwezigheid van rechter, behandelaar en psychiater die de geneeskundige verklaring heeft opgesteld"
Set score to 1

Goed.

Anything else
No score defined.

Fout.

Juiste antwoord:

De rol van de rechter bij een rechterlijke machtiging is: **[uiteindelijk beslissen of een patiënt een RM krijgt]**.
De hoorzitting **[vindt altijd plaats in aanwezigheid van rechter, behandelaar en psychiater die de geneeskundige verklaring heeft opgesteld]**.

c of azSecurity Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

Peter werkt als vrijwilliger bij de brandweer. Drie weken geleden was hij betrokken bij een reddingsactie die maar net goed afliep. Hij raakte beklemd tussen twee balken en kon dankzij een collega net op tijd weggelopen, voordat het gebouw deels instortte. Sindsdien heeft hij last van nachtmerries. Hij droomt dat hij vast zit en levend verbrandt. Hij wordt schreeuwend wakker. Overdag is hij prikkelbaar en kan hij zich niet concentreren. Hij checkt overal waar vluchtroutes zijn en gedraagt zich schichtig.

Diagnostisch is het meest waarschijnlijk dat hij lijdt aan:

- een acute stressstoornis
- een posttraumatische stressstoornis
- een aanpassingsstoornis
- een psychotische stoornis

IF choice a. is selected
Set score to 1

Goed.

d of az

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Mevrouw A. heeft in haar leven verschillende traumatische gebeurtenissen meegemaakt. Zowel in haar jeugd als ook later in relaties werd zij geconfronteerd met seksueel geweld. Als gevolg daarvan ontwikkelde ze een zogenaamde 'complexe PTSS' en komt ze in aanmerking voor therapie. Welke drie psychologische behandelvormen zijn bewezen effectief in het verminderen van haar PTSS-klachten?

- EMDR
- emotie regulatie training
- exposure therapie
- interpersoonlijke psychotherapie (IPT)

IF choice a. is selected
AND choice b. is selected
AND choice c. is selected
AND choice d. is NOT selected
Set score to 1

Goed.

Anything else
No score defined.

Fout.

Juiste antwoord:

- EMDR
- emotie regulatie training
- exposure therapie

e of az

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

In de DSM-5 zijn ten aanzien van de diagnose PTSS in de DSM-IV enkele kenmerken aangepast. Welke drie onderstaande kenmerken zijn veranderd?

- De duur van de klachten is bijgesteld naar 'langer dan 6 weken'.
- Er zijn extra symptomen toegevoegd.
- Het valt niet meer onder de angststoornissen.
- Je kunt een dissociatief subtype vaststellen.
- Vermijding is geen verplicht criterium meer.

IF choice a. is NOT selected
AND choice b. is selected
AND choice c. is selected
AND choice d. is selected
AND choice e. is NOT selected
Set score to 1

Goed.

Anything else

No score defined.

Fout.

Juiste antwoord:

- Er zijn extra symptomen toegevoegd.
- Het valt niet meer onder de angststoornissen.
- Je kunt een dissociatief subtype vaststellen.

f of az

Security Briefing : Briefing

LC : y

Test name : Test 1 or 2

Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

Persoonlijkheidsstoornissen predisponeren voor andere psychiatrische stoornissen.

Voor welke stoornis geldt dit?

- waanstoornis
- autismespectrumstoornis
- norm-overschrijdende gedragsstoornis
- kortdurende psychotische stoornis

IF choice d. is selected

Set score to 1

Goed.

g of az

Security Briefing : Briefing

LC : y

Test name : Test 1 or 2

Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

Tijdens uw coschap bij de studentenpsycholoog voert u een intakegesprek met een 19-jarige man die studiestress ervaart door uitstelgedrag. Hij blijkt perfectionistisch: opdrachten blijft hij aanvullen met nieuwe details waardoor hij deadlines niet haalt. Aan medestudenten bij groepsopdrachten stelt hij dezelfde hoge eisen. Een prille verliefdheid van een medestudente op hem heeft hij abrupt de kop ingedrukt omdat hij niet tegen verrassingen kan. Zijn ouders zijn precies, ordelijk en angstig.

Het beste behandelplan ziet er als volgt uit:

- cognitieve gedragstherapie voor obsessief-compulsieve stoornis, in combinatie met een SSRI
- cognitieve gedragstherapie voor uitstelgedrag, gevolgd door een psychotherapeutische behandeling voor de dwangmatige persoonlijkheidsstoornis
- een studiecoach adviseren, gevolgd door een cursus sociale omgang met studenten en docenten
- instellen op een SSRI, gevolgd door systeemtherapie met zijn ouders

IF choice b. is selected

Set score to 1

Goed.

h of az

Security Briefing : Briefing

LC : y

Test name : Test 1 or 2

Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

Op de verpleegafdeling interne geneeskunde wordt u in consult gevraagd i.v.m. samenwerkingsproblemen van de verpleegkundigen met een 39-jarige man. Hij lacht en huilt in hetzelfde gesprek, beheerst zijn impulsen nauwelijks en barst uit in woede, niet in verhouding staand tot de prikkel. Het bewustzijn is steeds helder. De verpleegkundige meldt dat hij bij periodes ook apathisch en achterdochtig is, soms zelfs met paranoïde ideeën.

Welke drie stoornissen mogen niet ontbreken in de differentiaaldiagnose?

- antisociale-persoonlijkheidsstoornis
- bipolaire stemmingsstoornis
- borderline-persoonlijkheidsstoornis
- delier
- histrionische-persoonlijkheidsstoornis
- persoonlijkheidsverandering door somatische aandoening
- schizotypische-persoonlijkheidsstoornis

IF choice a. is NOT selected

AND choice b. is selected

AND choice c. is selected

AND choice d. is NOT selected

AND choice e. is NOT selected

AND choice f. is selected

AND choice g. is NOT selected

Set score to 1

Goed.

Anything else
No score defined.

Fout.

Juiste antwoord:

- bipolaire stemmingsstoornis
- borderline-persoonlijkeitsstoornis
- persoonlijkheidsverandering door somatische aandoening

i of az

Security Briefing : Briefing

LC : y

Test name : Test 1 or 2

Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

Voor welke van de volgende psychiatrische stoornis is de op basis van tweelingstudies geschatte invloed van omgevingsfactoren het grootst?

- schizofrenie
- autisme
- ADHD
- depressie

IF choice d. is selected
Set score to 1

Goed.

j of az

Security Briefing : Briefing

LC : y

Test name : Test 1 or 2

Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

De heer V. wordt vanwege ernstige psychotische verschijnselen enkele maanden behandeld met een antipsychoticum. Hij geeft aan dat hij steeds minder zin heeft gekregen in seks en hij raakt minder opgewonden. Hij vraagt zich af of dit een bijwerking is van het middel, en of er middelen zijn die hier minder effect op hebben. De behandelend arts vertelt hem dat dit inderdaad een bijwerking is van de medicatie en dat patiënten er bij sommige antipsychotica meer last van hebben.

Wat kan de arts vertellen over de volgende middelen?

Plaats de middelen in rangorde van grote (1) naar kleine kans (3) op seksuele dysfunctie.

- 1 (i) aripiprazol (ii) clozapine (iii) risperidon
- 2 (i) aripiprazol (ii) clozapine (iii) risperidon
- 3 (i) aripiprazol (ii) clozapine (iii) risperidon

IF choice a. matches "risperidon"
AND choice b. matches "clozapine"
AND choice c. matches "aripiprazol"
Set score to 1

Goed.

Anything else
No score defined.

Fout.

Juiste antwoord:

- 1 - risperidon
2 - clozapine
3 - aripiprazol

k of az

Security Briefing : Briefing

LC : y

Test name : Test 1 or 2

Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

Tricyclische antidepressiva vormen een groep van klassieke antidepressiva. Zij verhogen de in de synapsspleet aanwezige hoeveelheid monoamine.

Via welk mechanisme vindt deze verhoging voornamelijk plaats?

Dit vindt plaats middels

- remming van heropname in het presynaptisch neuron.
- blokkade van presynaptische receptoren.

- stimulering van de monoaminerge synthese.
- remming van monoamine oxidase (MAO).

IF choice a. is selected
Set score to 1

Goed.

I of az

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Mirtazapine is een antidepressivum met een sterk antihistaminerge (H1), maar nagenoeg geen anticholinerge werking.
Welke bijwerking komt het **meest** voor bij mirtazapine?

- gewichtstoename
- jeuk
- obstipatie
- droge mond

IF choice a. is selected
Set score to 1

Goed.

m of az

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Casus 1

(vraag 13 en 14)

De heer W., 68 jaar, wordt vanwege de ziekte van Parkinson behandeld met een combinatie van levodopa en carbidopa, waarop hij goed was ingesteld. Sinds enkele weken reageert hij met ongecontroleerde bewegingen na inname van de medicatie, is onrustig, slaapt slecht en klaagt over allerlei beestjes die 's nachts onder zijn huid proberen te kruipen.
De neuroloog overlegt met de psychiater.

Wat is etiologisch gezien de beste diagnose?

- ticstoornis
- waanstoornis
- dementie door de ziekte van Parkinson
- delier

IF choice d. is selected
Set score to 1

Goed.

n of az

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Casus 1

(vervolg)

De heer W., 68 jaar, wordt vanwege de ziekte van Parkinson behandeld met een combinatie van levodopa en carbidopa, waarop hij goed was ingesteld. Sinds enkele weken reageert hij met ongecontroleerde bewegingen na inname van de medicatie, is onrustig, slaapt slecht en klaagt over allerlei beestjes die 's nachts onder zijn huid proberen te kruipen.
De neuroloog overlegt met de psychiater.

De psychiater besluit het atypische antipsychoticum olanzapine in een lage dosering voor te schrijven.
Waarom kiest de psychiater in deze situatie voor olanzapine en niet voor het goedkopere klassieke neurolepticum haloperidol?
Omdat olanzapine, in tegenstelling tot haloperidol, in therapeutische dosering

- een zeer selectieve blokker is van dopamine-D2-receptoren.
- blokkade van serotonine-5-HT2-receptoren en in mindere mate van dopamine-D2-receptoren veroorzaakt.
- geen blokkade veroorzaakt van muscarine receptoren.
- een zeer selectieve blokker is van serotonine-5-HT2-receptoren.

IF choice b. is selected

Set score to 1

Goed.

o of az

Security Briefing : Briefing

LC : y

Test name : Test 1 or 2

Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

Mevrouw K., 40 jaar, kan al een paar nachten de slaap niet vatten en is angstig vanwege een aantal nare gebeurtenissen die recent hebben plaatsgevonden. Ze vraagt haar huisarts om iets rustgeevends. De huisarts besluit om haar een kortwerkende benzodiazepine voor te schrijven om de angst te onderdrukken en makkelijker in slaap te komen.

Wanneer mevrouw K. na een paar weken terugkomt bij de huisarts vertelt ze hem dat het middel goed werkt en dat ze er hetzelfde gevoel van krijgt als na het drinken van een paar glazen wijn. Ook daar wordt ze namelijk minder angstig van.

De huisarts waarschuwt haar voor overmatig gebruik van alcohol. Desondanks besluit mevrouw K. dit advies te negeren. In de vroege ochtend wordt ze door haar man naar de eerste hulp gebracht met ernstige ademhalingsproblemen.

Na het uitvragen van haar medicijngebruik, besluit de arts om haar een injectie te geven met:

- haloperidol
- flumazenil
- morfine
- naltrexone

IF choice b. is selected

Set score to 1

Goed.

p of az

Security Briefing : Briefing

LC : y

Test name : Test 1 or 2

Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

Epidemiologisch onderzoek laat zien dat de kans dat je aan een middel verslaafd raakt sterk afhankelijk is van het soort middel.

Welk rangorde is correct voor onderstaande middelen, als de kans op verslaving afneemt van groot (1) naar klein (4)?

- 1 (i) alcohol (ii) cannabis (iii) heroine (iv) nicotine
- 2 (i) alcohol (ii) cannabis (iii) heroine (iv) nicotine
- 3 (i) alcohol (ii) cannabis (iii) heroine (iv) nicotine
- 4 (i) alcohol (ii) cannabis (iii) heroine (iv) nicotine

IF choice a. matches "nicotine"

AND choice b. matches "heroine"

AND choice c. matches "alcohol"

AND choice d. matches "cannabis"

Set score to 1

Goed.

Anything else

No score defined.

Fout.

juiste antwoord:

- 1 - nicotine
- 2 - heroine
- 3 - alcohol
- 4 - cannabis

q of az

Security Briefing : Briefing

LC : y

Test name : Test 1 or 2

Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

De belonende effecten van alcohol kunnen worden verminderd door toediening van naloxon, een stof die de opiaatreceptor blokkeert.

De meest logische verklaring voor dit effect is dat

- alcohol de afgifte van endogene opiaten stimuleert.
- blokkade van de opiaat receptor de afbraak van alcohol stimuleert.
- naloxon aan alcohol bindt en de werking verhindert.
- alcohol direct aangrijpt op de opiaat receptor.

IF choice a. is selected

Set score to 1

Goed.

r of az

Security Briefing : Briefing

LC : y

Test name : Test 1 or 2

Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

Een 61-jarige vrouw wordt opgenomen op de afdeling interne geneeskunde vanwege een urineweginfectie. Zij is bekend met een frontotemporale dementie. Op de afdeling is zij ontremd, gedesoriëteerd in tijd en plaats, en onrustig. Zij maakt een ritmisch wiegende beweging waarbij zij steeds haar oor en knie aantikt. De verpleegkundige vertelt dat de symptomen wisselen in de loop van de dag.

Welk klinisch gegeven levert de belangrijkste aanwijzing dat er, naast de dementie, ook sprake is van een delier?

- de desoriëntatie
- de ontremming
- het fluctuerende beloop
- de motorische stereotypieën

IF choice c. is selected

Set score to 1

Goed.

s of az

Security Briefing : Briefing

LC : y

Test name : Test 1 or 2

Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

In het coschap huisartseneeskunde gaat u op huisbezoek bij mw S., een vriendelijke 71-jarige vrouw met cognitieve stoornissen. Volgens het dossier van de huisarts ontkent patiënte zelf enig geheugenverlies, maar volgens haar 40-jarige dochter bestaat er een snel uitbreidende vergeetachtigheid. De notities van de huisarts vermelden voorts een helder bewustzijn, meestal normale aandacht, woordvindingsproblemen en perseveratie. U besluit een Mini Mental State Examination af te nemen (MMSE).

Wat verwacht u ten aanzien van de MMSE score uitslag?

- score \geq 27 punten
- score 19 - 24 punten
- score \leq 15 punten

IF choice b. is selected

Set score to 1

Goed.

t of az

Security Briefing : Briefing

LC : y

Test name : Test 1 or 2

Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

Het hersenvreesysteem is bij mensen met een angststoornis overactief en veroorzaakt te snel arousal klachten.

Door welk deel van het hersenvreesysteem worden deze arousal klachten veroorzaakt?

- ventrale striatum
- hippocampus
- amygdala
- hypothalamus
- thalamus
- hersenstam

IF choice f. is selected

Set score to 1

Goed.

u of az

Security Briefing : Briefing

LC : y

Test name : Test 1 or 2

Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

In de differentiatie van angststoornissen kan het helpen om naar de focus van de angstklachten te vragen.

Welke vraag past bij de sociale angststoornis?

- Bent u bang om te vallen en dan geen hulp te krijgen?
- Bent u bang hulpeloos te zijn in geval van onwel worden?

- Bent u bang voor allerlei narigheid die in het leven kan vóórkomen?
- Bent u bang voor de negatieve beoordeling door anderen?
- Bent u bang voor incontinentie wanneer er geen wc aanwezig is?

IF choice d. is selected
Set score to 1

Goed.

v of az

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

De lifetime prevalentie van bipolaire stoornissen is

- lager voor mannen dan voor vrouwen
- hoger voor mannen dan voor vrouwen
- gelijk voor mannen en vrouwen

IF choice c. is selected
Set score to 1

Goed.

w of az

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Hoe kun je bij een depressieve patiënt onderscheid maken tussen een depressieve stoornis en een bipolaire stoornis?

- met behulp van een functionele MRI-scan van de hersenen
- door de familiäre belasting te onderzoeken
- op basis van de aanwezigheid van psychotische verschijnselen
- door te vragen naar manie of hypomanie in de voorgeschiedenis

IF choice d. is selected
Set score to 1

Goed.

x of az

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Welke bevindingen uit lichamelijk of laboratoriumonderzoek worden regelmatig gecheckt bij een patiënt die wordt behandeld met lithium?
Lichamelijk onderzoek of labwaarden die informatie verschaffen over het functioneren van

- schildklier en nieren
- lever en bijnier
- lever en bijschildklier
- glucose en bloeddruk

IF choice a. is selected
Set score to 1

Goed.

y of az

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Bij het moduleren van "voorspellend coderen" in de cortex beïnvloeden monamines de

- precisie van de voorspellingsfout
- feed forward precisie
- sterkte van de voorspelling
- snelheid van de voorspelling feedback

IF choice a. is selected
Set score to 1

Goed.

z of az

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

De hoogste dichtheid van dopaminerge vezels wordt aangetroffen in

- de hippocampus
- de amygdala
- het striatum
- de prefrontale cortex

IF choice c. is selected
Set score to 1

Goed.

aa of az

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Een 45-jarige vrouw voldoet aan de diagnose depressieve stoornis en heeft daarbij klachten van overmatige vermoeidheid, veel slapen en gewichtstoename. De arts-assistent denkt aan twee subtypen van depressie, maar hij kan het onderscheid nog niet maken. Welke vraag moet hij stellen om het onderscheid wél te kunnen maken?

- Heeft u last van gedachtevlucht?
- Wordt u vroeg wakker?
- Treden uw klachten in een bepaalde periode van het jaar op?
- Heeft u het gevoel de zelfbeheersing te verliezen?

IF choice c. is selected
Set score to 1

Goed.

ab of az

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Welk van onderstaande kenmerken onderscheidt interpersoonlijke psychotherapie (IPT) van cognitieve gedragstherapie (CGT)?

- psycho-educatie depressie
- dagboeken en huiswerkopdrachten
- sociogram
- duur van de behandeling 12-16 sessies

IF choice c. is selected
Set score to 1

Goed.

ac of az

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Wat zijn, naast wanen, grie symptomen van schizofrenie?

- angst
- apathie
- depressie
- desorganisatie
- hallucinaties

IF choice a. is NOT selected
AND choice b. is selected
AND choice c. is NOT selected
AND choice d. is selected
AND choice e. is selected

Set score to 1

Goed.

Anything else
No score defined.

Fout.

Juiste antwoord:

- apathie
- desorganisatie
- hallucinaties

ad of az

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Casus 2

(vraag 30 t/m 32)

Darian, 23 jaar, wordt op zondagochtend door de politie aangehouden op de ring van de A10, omdat hij 220 km/uur rijdt op de linkerbaan. Hij heeft een masker met hoorntjes op, en is geheel in het rood gekleed. Als de politie naar zijn beweegreden vraagt, antwoordt hij: "Hoe komen jullie erbij om mij te stoppen? Ik ben de nieuwe testrijder voor Red Bull. Ik word op afstand bestuurd vanuit het Formule 1 centrum: deze auto wil alleen maar links rijden".

De politie schakelt de crisisdienst in voor een beoordeling.
In het psychiatrisch onderzoek wordt "Ik ben de nieuwe testrijder voor Red Bull" beschreven als

- dwanggedachte
 - betrekingswaan
 - illusionaire vervalsing
 - neologisme
-

IF choice b. is selected
Set score to 1

Goed.

ae of az

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Casus 2

(vervolg)

Darian, 23 jaar, wordt op zondagochtend door de politie aangehouden op de ring van de A10, omdat hij 220 km/uur rijdt op de linkerbaan. Hij heeft een masker met hoorntjes op, en is geheel in het rood gekleed. Als de politie naar zijn beweegreden vraagt, antwoordt hij: "Hoe komen jullie erbij om mij te stoppen? Ik ben de nieuwe testrijder voor Red Bull. Ik word op afstand bestuurd vanuit het Formule 1 centrum: deze auto wil alleen maar links rijden".

De arts-assistent overweegt waar zij "Ik word op afstand bestuurd" gaat beschrijven in het psychiatrisch onderzoek.
Dit psychische symptoom hoort onder

- waarneming
 - vorm van het denken
 - oriëntatie
 - inhoud van het denken
-

IF choice d. is selected
Set score to 1

Goed.

af of az

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Casus 2

(vervolg)

Darian, 23 jaar, wordt op zondagochtend door de politie aangehouden op de ring van de A10, omdat hij 220 km/uur rijdt op de linkerbaan. Hij heeft een masker met hoorntjes op, en is geheel in het rood gekleed. Als de politie naar zijn beweegreden vraagt, antwoordt hij: "Hoe komen jullie erbij om mij te stoppen? Ik ben de nieuwe testrijder voor Red Bull. Ik word op afstand bestuurd vanuit het Formule 1 centrum: deze auto wil alleen maar links rijden".

Uit gesprekken met de familie blijkt Darian zich de afgelopen 5 weken anders te gedragen. Sinds 3 maanden is hij om onduidelijke redenen niet meer aan het werk.

Wat is de meest waarschijnlijke diagnose?

- schizofreniforme stoornis
 schizo-affectieve stoornis
 kortdurende psychotische stoornis
 schizotypische-persoonlijkheidsstoornis

IF choice a. is selected
 Set score to 1

Goed.

ag of az

Security Briefing : Briefing

LC : y

Test name : Test 1 or 2

Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

Welke vier neurotransmitters spelen een rol bij schizofrenie?

- adrenaline
 arganine
 dopamine
 GABA
 glutamaat
 noradrenaline
 serotonine

IF choice a. is NOT selected
 AND choice b. is NOT selected
 AND choice c. is selected
 AND choice d. is selected
 AND choice e. is selected
 AND choice f. is selected
 AND choice g. is NOT selected
 Set score to 1

Goed.

Anything else
 No score defined.

Fout.

Juiste antwoord:

- dopamine
- GABA
- glutamaat
- noradrenaline

ah of az

Security Briefing : Briefing

LC : y

Test name : Test 1 or 2

Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

Een patiënt heeft een grote tumor in het linker orbitofrontale gebied van de hersenen.

Geef aan of u bij deze patiënt veranderingen en/of problemen verwacht wat betreft:

- a. executieve functies ja nee
 b. motoriek van de linker arm ja nee
 c. productie van spraak ja nee
 d. sensibiliteit van de rechter arm ja nee

IF choice a.(i) is selected
 AND choice b.(ii) is selected
 AND choice c.(ii) is selected
 AND choice d.(ii) is selected
 Add 1 to score. Continue evaluating.

Anything else

No score defined.

Fout.

Juiste antwoord:

- executieve functies - ja
- motoriek van de linker arm - nee
- productie van spraak - nee
- sensibiteit van de rechter arm - nee

ai of az

Security Briefing : Briefing

LC : y

Test name : Test 1 or 2

Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

Patiënt H. loopt de spreekruimte in van de huisarts. Hij gaat zitten en barst in tranen uit. De huisarts reageert direct en zegt: 'Stil maar, u hoeft niet te huilen'.

In welke communicatieve valkuil trapt de arts hier?

- de ander gevoelens toedichten
- ontkrachten
- te snelle identificatie
- vluchten in feiten
- onterechte geruststelling
- willen oplossen

IF choice e. is selected

Set score to 1

Goed.

aj of az

Security Briefing : Briefing

LC : y

Test name : Test 1 or 2

Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

Welke gesprekstechniek leent zich het best voor het toedekken van emoties?

- hier en nu
- doorvragen
- confronteren
- erkennen
- personaliseren
- stiltes

IF choice a. is selected

Set score to 1

Goed.

ak of az

Security Briefing : Briefing

LC : y

Test name : Test 1 or 2

Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

In de huisartsenpraktijk ziet u de 41-jarige heer R. in verband met een depressie. In overleg besluit u over te gaan tot medicamenteuze behandeling met een tricyclisch antidepressivum (TCA). De bijwerkingen van TCA's kunnen worden toegeschreven aan agonisme en antagonisme van bepaalde neurotransmitters.

Welke van de volgende klasse bijwerkingen verwacht u niet bij de behandeling met een TCA?

- anti-histaminerg
- anti-noradrenerg
- anti-dopaminerg
- anti-cholinerg

IF choice c. is selected

Set score to 1

Goed.

al of az

Security Briefing : Briefing

LC : y

Test name : Test 1 or 2

Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

Wat is de effectiviteit van ECT bij patiënten met een medicatie-resistente depressie?

- 10%
 40%
 60%
 90%

IF choice c. is selected
 Set score to 1

Goed.

am of az

Security Briefing : Briefing
 LC : y
 Test name : Test 1 or 2
 Difficulty : CTT Level
 PorterGamGad : include

Casus 3

(vraag 39 en 40)

De heer F., 31 jaar, is opgenomen in verband met een ernstig psychotisch toestandbeeld. Sinds een week slijkt hij haloperidol 5mg onder toezicht. Het valt de verpleging op dat hij nauwelijks zijn kamer uitkomt, ondanks pogingen hem te activeren. Hij ligt vaak in bed. Hij spreekt weinig met anderen, en dit lijkt zelfs minder te worden. Als de zaalarts hem op zijn kamer bezoekt, valt op dat de heer F. roerloos in zijn bed ligt maar wel beweegt met zijn ogen. Hij reageert niet op (pijn)prikkels. De zaalarts vraagt hem zijn arm op te tillen. De heer F. lijkt hem wel te horen, maar er gebeurt niets. Bij passieve flexie van zijn ellebooggewricht voelt de arts een hortende, stotende weerstand over het gehele bewegingstraject. Als de arts de arm loslaat, valt deze terug op het bed.

Beoordeel de 2 volgende onderzoeksbevindingen:

1. Er bestaat (i) wel katatonie (ii) geen katatonie .
 2. Er bestaat (i) wel katalapsie (ii) geen katalapsie .

IF choice a. matches "wel katatonie"
 AND choice b. matches "geen katalapsie"
 Set score to 1

Goed.

Anything else
 No score defined.

Fout.

Juiste antwoord:

1. Er bestaat [wel katatonie].
 2. Er bestaat [geen katalapsie].

an of az

Security Briefing : Briefing
 LC : y
 Test name : Test 1 or 2
 Difficulty : CTT Level
 PorterGamGad : include

Casus 3

(vraag 39 en 40)

De heer F., 31 jaar, is opgenomen in verband met een ernstig psychotisch toestandbeeld. Sinds een week slijkt hij haloperidol 5mg onder toezicht. Het valt de verpleging op dat hij nauwelijks zijn kamer uitkomt, ondanks pogingen hem te activeren. Hij ligt vaak in bed. Hij spreekt weinig met anderen, en dit lijkt zelfs minder te worden. Als de zaalarts hem op zijn kamer bezoekt, valt op dat de heer F. roerloos in zijn bed ligt maar wel beweegt met zijn ogen. Hij reageert niet op (pijn)prikkels. De zaalarts vraagt hem zijn arm op te tillen. De heer F. lijkt hem wel te horen, maar er gebeurt niets. Bij passieve flexie van zijn ellebooggewricht voelt de arts een hortende, stotende weerstand over het gehele bewegingstraject. Als de arts de arm loslaat, valt deze terug op het bed.

De psychomotorische klachten van de heer F. kunnen bij een aantal ziektebeelden voorkomen.
 Voor welke vier van onderstaande stoornissen is dit bekend?

- atypische depressie
 autisme spectrumstoornis
 depressie met psychotische kenmerken
 dwangmatige persoonlijkheidsstoornis
 neoplasmata
 stofwisselingsstoornis
 waanstoornis

IF choice a. is NOT selected
AND choice b. is selected
AND choice c. is selected
AND choice d. is NOT selected
AND choice e. is selected
AND choice f. is selected
AND choice g. is NOT selected
Set score to 1

Goed.

Anything else
No score defined.

Fout.

Juiste antwoord:

- autisme spectrumstoornis
- depressie met psychotische kenmerken
- neoplasmata
- stofwisselingsstoornis

[ao of az](#)

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

De heer M. gebruikt al langere tijd een antipsychoticum vanwege schizofrenie. De laatste tijd heeft hij toenemend last van onwillekeurige bewegingen met zijn tong, lippen en kauwspieren.
Hoe wordt de bijwerking waar de heer M. last van heeft genoemd?

- acute dystonie
- parkinsonisme
- acathisie
- tardieve dyskinesie

IF choice d. is selected
Set score to 1

Goed.

[ap of az](#)

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Een 75-jarige vrouw komt bij de huisarts in verband met toenemende vergeetachtigheid. Zij kan niet meer goed voor zichzelf zorgen en raakt de weg kwijt. De huisarts besluit om een MRI van het brein te laten maken, waarop hippocampusatrofie wordt gezien.
Welke diagnose is het meest waarschijnlijk op basis van deze gegevens?

- Alzheimer dementie
- delier
- Lewy body dementie
- ziekte van Parkinson

IF choice a. is selected
Set score to 1

Goed.

[aq of az](#)

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

De echtgenote van de heer P. komt mee naar het spreekuur in de huisartsenpraktijk, en vertelt dat de heer P. erg onrustig is in zijn slaap. Hij wordt vaak paniekerig en schreeuwend wakker. Daarnaast slaapwandelt hij weleens.
Binnen welke slaapstoornis passen deze symptomen?

- hypersomnia
- parasomnia
- circadiane slaapstoornis
- insomnia

IF choice b. is selected
Set score to 1

Goed.

ar of az

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

U ziet mevrouw T. op de polikliniek. Zij wil graag stoppen met roken. Zij heeft al meerdere pogingen ondernomen, maar het is haar nog niet gelukt. Zij vraagt of er medicijnen bestaan die haar hierbij kunnen helpen. Welk effectief medicijn moet worden voorgeschreven?

- topiramaat
- varenicline
- disulfiram
- acamprosaat

IF choice b. is selected
Set score to 1

Goed.

as of az

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Op de polikliniek kinderpsychiatrie ziet u een vader met zijn 10-jarige zoon J. in verband met al langer bestaand druk en impulsief gedrag en problemen op school. U checkt de ADHD-criteria met vader. Welke drie antwoorden zijn ADHD-criteria?

- moeite om aandacht bij een taak te houden
- praat aan een stuk door
- snel prikkelbaar en boos zijn
- vaak moeilijk inslapen
- vergeetachtig zijn bij dagelijkse bezigheden

IF choice a. is selected
AND choice b. is selected
AND choice c. is NOT selected
AND choice d. is NOT selected
AND choice e. is selected
Set score to 1

Goed.

Anything else
No score defined.

Fout.

Juiste antwoord:

- moeite om aandacht bij een taak te houden
- praat aan een stuk door
- vergeetachtig zijn bij dagelijkse bezigheden

at of az

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Bij u op het consultatiebureau komt een moeder met haar zoon B. van 3 jaar oud. Moeder maakt zich zorgen, omdat hij nog niet praat en ook helemaal

niet lijkt te regeren als iemand iets tegen hem zegt of zijn naam roept. Hij reageert eigenlijk alleen als hij een mooie auto ziet, dan maakt hij opgewonden geluiden en zwaait druk met zijn armen.

Welke diagnose is het meest waarschijnlijk?

- autistische stoornis
- doofheid
- spraak-taal stoornis
- hechtingsstoornis

IF choice a. is selected
Set score to 1

Goed.

[au of az](#)

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

De ouders van N. van 4 jaar oud zijn bij u op de familie polikliniek kinderpsychiatrie. Bij N. is recent de diagnose autisme-spectrumstoornis gesteld. Vader herkent bij zichzelf ook kenmerken van autisme en de ouders willen dat graag uitgezocht hebben.

Wat voor onderzoek is nu geïndiceerd?

- neuropsychologisch onderzoek
- observatie en ontwikkelingsanamnese
- MRI onderzoek
- genetisch onderzoek

IF choice b. is selected
Set score to 1

Goed.

[av of az](#)

Security Briefing : Briefing
LC : y
Test name : Test 1 or 2
Difficulty : CTT Level
PorterGamGad : include

Casus 4

(vraag 48 en 49)

Sanne is een 15-jarige adolescente die sinds de overgang naar de middelbare school toenemend teruggetrokken gedrag heeft laten zien. Ze werkt heel hard voor school, maar kan zich vaak moeilijk concentreren. Haar cijfers vallen haar dan ook tegen. Af en toe denkt ze wel eens dat het nooit meer goed komt met haar. Soms probeert ze in haar arm te krassen met een mesje wat zij in haar nachtkastje bewaart, dat helpt dan even maar later krijgt zij hier weer spijt van. Sanne vertelt dat ze wordt gepest door de kinderen in haar klas, wat haar soms onzeker maakt. Ze vinden haar een 'nerd'. Sanne vindt dit wel vervelend, maar wil vooral dat het weer beter gaat met haar schoolresultaten. Ze vertelt u dat ze denkt dat haar ouders dat het belangrijkste vinden. U spreekt apart met de moeder van Sanne. Zij vertelt u dat Sanne de laatste tijd snel boos wordt en steeds op haar kamer zit. Ze is bijna nooit meer bij het avondeten en waarschijnlijk ook wat afgevallen. Ook valt het haar op dat ze opeens donkere wijde kleding is gaan dragen, waar ze tot voor kort vooral in T-shirts van haar favoriete tv-serie "Adventure Time" liep. Moeder heeft een briefje gevonden waarin Sanne zegt "dat het haar spijt, maar ze niet meer verder kon". Moeder maakt zich zorgen dat Sanne zichzelf iets aan gaat doen.

Welke vijf kenmerken uit deze casus passen bij een depressieve stoornis?

- angstklachten
- concentratieproblemen
- gedachten aan de dood
- prikkelbare stemming
- schoolproblemen
- slaapproblemen
- veranderde eetlust
- verlaagd zelfbeeld
- verminderd genieten
- zelfverwonding

IF choice a. is NOT selected
AND choice b. is selected
AND choice c. is selected
AND choice d. is selected
AND choice e. is NOT selected
AND choice f. is NOT selected
AND choice g. is selected
AND choice h. is selected
AND choice i. is NOT selected
AND choice j. is NOT selected

Set score to 1

Goed.

Anything else
No score defined.

Fout.

Juiste antwoord:

- concentratieproblemen
- gedachten aan de dood
- prikkelbare stemming
- veranderde eetlust
- verlaagd zelfbeeld

aw of az

Security Briefing : Briefing

LC : y

Test name : Test 1 or 2

Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

Casus 4

(vraag 48 en 49)

Sanne is een 15-jarige adolescente die sinds de overgang naar de middelbare school toenemend teruggetrokken gedrag heeft laten zien. Ze werkt heel hard voor school, maar kan zich vaak moeilijk concentreren. Haar cijfers vallen haar dan ook tegen. Af en toe denkt ze wel eens dat het nooit meer goed komt met haar. Soms probeert ze in haar arm te krassen met een mesje wat zij in haar nachtkastje bewaart, dat helpt dan even maar later krijgt zij hier weer spijt van. Sanne vertelt dat ze wordt gepest door de kinderen in haar klas, wat haar soms onzeker maakt. Ze vinden haar een 'nerd'. Sanne vindt dit wel vervelend, maar wil vooral dat het weer beter gaat met haar schoolresultaten. Ze vertelt u dat ze denkt dat haar ouders dat het belangrijkste vinden. U spreekt apart met de moeder van Sanne. Zij vertelt u dat Sanne de laatste tijd snel boos wordt en steeds op haar kamer zit. Ze is bijna nooit meer bij het avondeten en waarschijnlijk ook wat afgevallen. Ook valt het haar op dat ze opeens donkere wijde kleding is gaan dragen, waar ze tot voor kort vooral in T-shirts van haar favoriete tv-serie "Adventure Time" liep. Moeder heeft een briefje gevonden waarin Sanne zegt "dat het haar spijt, maar ze niet meer verder kon". Moeder maakt zich zorgen dat Sanne zichzelf iets aan gaat doen.

Sanne is een 15-jarige adolescente die sinds de overgang naar de middelbare school toenemend teruggetrokken gedrag heeft laten zien. In een adviesgesprek na de diagnostiek wordt aan Sanne en ouders uitgelegd dat er waarschijnlijk sprake is van een depressie. Ouders hebben moeite om dit te begrijpen, omdat ze hun dochter een echte puber vinden. Ze luistert slecht en heeft vaak ruzie met ouders. Ook vragen ze zich af waarom ze niet meer vriendinnen heeft, ze lijkt deze helemaal niet op te zoeken en zit vooral op haar kamer te gamen. Ze is bijna nooit meer bij het avondeten en waarschijnlijk ook wat afgevallen. Ook valt het haar op dat ze opeens donkere wijde kleding is gaan dragen, waar ze tot voor kort vooral in T-shirts van haar favoriete tv-serie "Adventure Time" liep.

Welke drie diagnoses staan naast depressie hoog in de differentiaaldiagnose bij Sanne?

- ADHD
- autisme
- bipolaire stoornis
- eetstoornis
- gegeneraliseerde angststoornis
- leerstoornis
- normoverschrijdende gedragsstoornis
- oppositionele opstandige gedragsstoornis
- schizofrenie
- stemmingsstoornis door een middel

IF choice a. is NOT selected
AND choice b. is selected
AND choice c. is NOT selected
AND choice d. is selected
AND choice e. is NOT selected
AND choice f. is NOT selected
AND choice g. is NOT selected
AND choice h. is selected
AND choice i. is NOT selected
AND choice j. is NOT selected
Set score to 1

Goed.

Anything else
No score defined.

Fout.

Juiste antwoord:

- autisme
- eetstoornis
- oppositionele opstandige gedragsstoornis

ax of az

Security Briefing : Briefing

LC : y

Test name : Test 1 or 2

Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

Als net 13-jarige heeft D. al veel meegemaakt. Hij is meerdere malen geplaatst bij andere opvoed-/pleegouders. Recent is het ook op school geëscaleerd. Na een vechtpartij, waarbij hij een medeleerling met een stok ernstig verwondde, is hij geschorst. Volgens pleegouders komt het doordat hij medicatie niet had genomen. Verder geven ze aan dat hij tegenover hen veel liegt om geld te krijgen, en hij vaak boos en gepikeerd is. D. geeft aan dat hij door deze leerling werd uitgedaagd en hij onterecht geschorst is.

Welke twee van de volgende kenmerken passen bij een normoverschrijdende gedragsstoornis?

- laten uitdagen met onterechte schorsing als gevolg
- vaak boos en gepikeerd
- vechtpartij, waarbij hij een medeleerling met een stok ernstig verwondde
- veel liegen om geld te krijgen
- (volgens pleegouders) medicatie niet ingenomen

IF choice a. is NOT selected
 AND choice b. is NOT selected
 AND choice c. is selected
 AND choice d. is selected
 AND choice e. is NOT selected
 Set score to 1

Goed.

Anything else
 No score defined.

Fout.

Juiste antwoord:

- vechtpartij, waarbij hij een medeleerling met een stok ernstig verwondde
- veel liegen om geld te krijgen

ay of az

Security Briefing : Briefing

LC : y

Test name : Test 1 or 2

Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

Eetstoornissen kunnen vroeg in de ontwikkeling ontstaan.

Welke eetstoornis begint het vroegst?

- eetbuistoornis
- boulimia nervosa
- anorexia nervosa

IF choice c. is selected
 Set score to 1

Goed.

az of az

Security Briefing : Briefing

LC : y

Test name : Test 1 or 2

Difficulty : CTT Level

PorterGamGad : include

Mevrouw L. is 6 dagen geleden bevallen van een zontje. Sinds twee dagen is ze licht verward, prikkelbaar, labiel en heeft ze plotselinge huilbuien. Welk fenomeen is hier het meest waarschijnlijk?

- peri-partum depressie
- peri-partum angststoornis
- kraambedpsychose
- kraamtranen

IF choice d. is selected
 Set score to 1

Goed.

Feedback
0% to 100%

Je hebt %SESSION.SCORE% van de %SESSION.MAX% vragen juist beantwoord.

